



Pneumovax^{MD} 13 est un vaccin qui contribue à protéger les personnes à risque contre la pneumonie et d'autres maladies graves causées par 13 types de pneumocoque (bactérie *Streptococcus pneumoniae*).

Antécédents de vaccination contre le pneumocoque

Je n'ai jamais reçu de vaccin contre le pneumocoque.

J'ai reçu une dose d'un vaccin contre le pneumocoque il y a moins d'un an | Date: _____

J'ai reçu une dose d'un vaccin contre le pneumocoque il y a plus d'un an | Date: _____

Je ne sais pas.

QUI PRÉSENTE UN RISQUE ?

- Tout adulte de 50 ans ou plus en bonne santé ou ayant certains facteurs de risque liés au mode de vie ou des problèmes de santé sous-jacents
- Tout adulte de 18 ans ou plus ayant certains facteurs de risque liés au mode de vie ou des problèmes de santé sous-jacents

Cochez tous les éléments qui s'appliquent à vous et passez la liste en revue avec votre professionnel de la santé pour savoir si vous devriez recevoir le vaccin Pneumovax 13.

J'ai 50 ans ou plus.

J'ai 18 ans ou plus.

Problèmes de santé

Maladie chronique des poumons (incluant l'**asthme** et la MPOC)

Maladie chronique du cœur

Diabète

Certaines affections neurologiques

Maladie chronique du foie

Maladie chronique des reins

Cancer (p. ex., maladie de Hodgkin, leucémie, myélome multiple, lymphome)

Immunosuppression

en raison d'une maladie comme le VIH/sida

en raison de la prise d'un médicament qui inhibe la réponse immunitaire (p. ex., receveurs de greffe d'organe ou de moelle osseuse)

Port d'un implant cochléaire

Écoulement de liquide céphalorachidien

Anémie falciforme

Dysfonctionnement ou ablation de la rate

Habitudes et mode de vie

Je fume.

J'ai déjà été alcoolique.

Je vis dans un établissement de soins de longue durée.

Peu importe les antécédents en matière de vaccination contre le pneumocoque, si l'on envisage la vaccination séquentielle par Pneumovax 13 et par le vaccin antipneumococcique polysaccharidique, Pneumovax 13 devrait être administré en premier.

DIN : 02335204

Prevnar 13 peut être financé par le régime public si vous présentez certains facteurs de risque. Consultez votre professionnel de la santé pour savoir si vous êtes admissible au remboursement.

Passez vos réponses en revue avec votre professionnel de la santé pour savoir si Prevnar 13 vous convient.

L'immunisation est un moyen important de prévenir la pneumonie et d'autres pneumocoques.

Comme tous les vaccins, Prevnar 13 ne confère pas une protection intégrale. Prevnar 13 ne prévient que les maladies causées par les types de *S. pneumoniae* qui sont dans le vaccin.

Prevnar 13 ne doit pas être administré aux personnes allergiques (hypersensibles) aux substances actives qu'il renferme, à tout autre ingrédient du vaccin ou à tout autre vaccin qui contient l'anatoxine diphtérique.

Faites particulièrement attention avec Prevnar 13 si :

- vous avez ou avez eu des problèmes médicaux après avoir reçu une dose de Prevnar 13;
- vous avez une forte fièvre;
- vous avez un trouble de la coagulation.

Voici les effets secondaires les plus fréquents, soit ceux qui ont été observés chez au moins 1 adulte sur 10 : perte d'appétit; maux de tête; diarrhée; éruption cutanée; apparition/aggravation de douleurs articulaires; apparition/aggravation de douleurs musculaires; frissons; fatigue; vomissements (chez les adultes âgés de 18 à 49 ans); douleur, sensibilité, rougeur, enflure ou durcissement quelconques au point de vaccination; douleur qui gêne les mouvements du bras. Les effets secondaires fréquents, observés chez au moins 1 adulte sur 100, mais chez moins de 1 adulte sur 10, sont les vomissements (chez les adultes âgés de 50 ans ou plus) et la fièvre.

NOTES

MPOC : Maladie pulmonaire obstructive chronique

PREVNAR^{MD} 13, Wyeth LLC, Pfizer Canada inc., licencié
© 2017 Pfizer Canada inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5



PrevnarTM 13

D000060225
PP-PNA-CAN-009Z-FR